Par Mr Jerin de Strasbourg

3

Observation sur une hernie entero épiplocelle.

le traitement des hernies avec gangrene a été de nos jours perfectionné a un point tel, quil ne paroit guerre possible que l'art fasse sur cet objet des progrés considerables. Mr. Louis dans les mémoires que l'académie a publié semble avoir prévu tous les cas possibles. la doctrine quil a établi est d'autant plus precieuse quelle est fondée sur des observations recueillies avec soin, et quil en a tiré des inductions qui ont certainement echappés aux aucteurs de ces observations; il a determiné d'une maniere précise les avantages et les inconvénients qui pourroient résulter dela cure radicale des hernies avec deperdition de substance il a fait voir dans quelles circonstances on pouvoit la tenter et il a montré quil y en avoit qui exigeoient quon établit un anus contre nature il a levé l'incertitude qui ~~sembloit~~ paroissoit resulter des réussites et des malheurs arrivées a des praticiens qui sembloient se conduire sur les mêmes principes. il a prouvé que des evenements quon attribue que trop souvent au hazard sont cependant une suitte nécessaire des circonstances qui les accompagnent: tant il est vrai de dire quil n'appartient qu'a l'homme de génie de lever une partie du voile dont la nature est enveloppée. je n'abuserai donc point dela patience de l'academie en rapportant icy les avis des differents aucteurs sur cequ'on doit faire quand l'intestin est gangrené; je me contenterai de mettre sous ses yeux un fait qui sans etre trés rare, n'arrive pas touts les jours et j'aurai d'autant plus de droit a son indulgence que je ne dissimulerai point des fautes que je n'aurois point fait si ses mémoires eussent été alors publiées.

En 1756 l'on m'appella pour voir une femme agée de 58 ans qui depuis dix jours avoit une hernie inguinale avec etranglement. son chirurgien avoit employé pendant ce tems les remedes prescrits en pareil cas et malgré des tentatives réiterées il n'avoit pu parvenir a faire rentrer la tumeur. la malade vomissoit des matieres stercorales elle avoit le hoquet

ARC 15 d 107, n°2

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

le poul étoit petit, fréquent, les yeux éteints et tout sembloit annoncer une mort prochaine. j'examinai la tumeur qui étoit fort grosse, de couleur livide et molle : l'état dangereux de cette femme ne m'empecha pas de proposer l'operation comme le seul moyen de la tirer d'affaire. deux autres chirurgiens que l'on appella furent de même avis et je procedai a l'operation quand je fus parvenu dans l'interieur du sac herniaire il en sortit une grande quantitée d'eau très foetide et nous trouvames une portion considerable de l'epiploon et d'intestin qui étoit noirs et pourris. cette circonstance a la quelle je m'attendois m'empecha de dilater l'anneau. je tirai doucement l'epiploon et quand j'eus la partie saine, je retranchai cequi étoit pourri. je fis de même de l'intestin ; outre les cinq pouces qui étoient dans la tumeur et qui étoient gangrenés en le faisant doucement sortir du bas ventre j'en trouvai encore quatre pouces dans le même état. je ~~re~~tranchai sur le champ cette portion intestinale avec une partie du mésentere qui étoit aussi corrompue de maniere que le canal se trouva racourci de neuf pouces ou environ : quand cela fut fait je fis rentrer les bouts l'un dans l'autre, je les unis ensemble par quelques points de suture et je fis rentrer l'intestin dans le ventre ayant pris la précaution de laisser pendre les extrémités du fil hors dela playe. j'emportai une partie du sac herniaire. je mis dans l'anneau une tente fort petite pour donner en cas de besoin issue a la matiere ; et le reste du pansement s'est fait a l'ordinaire.

je ne crois pas nécessaire de détailler cequi se passa dans le cour dela guérison, des saignées des lavements furent employés les premiers jours, le ventre s'ouvrit, la suppuration s'établit, le quinzieme jour les fils se détacherent d'eux mêmes et en six semaines cette femme fut guerrie radicalement.

j'aurois du sans doute attendre que le dégorgement fut fait avant de réunir les deux bouts d'intestin, et je m'exposois en ne prenant point les précautions indiquées par Mr. Louis a faire rentrer le bout inferieur dans le superieur cequi n'est pas sans inconvénient a beaucoup près. la nature et le hazard me servirent dans cette occasion et le succès que j'obtins me fit un honneur que j'aurois mieux mérité si j'eusse suivi les préceptes de l'art, mais je ne les connoissois pas alors et je n'ai presenté a l'academie cette observation que pour qu'elle ait un fait de plus qui prouve que le canal intestinal peut recouvrer sa continuité.

N° 111 — Deux pièces